



民衆經醫師診斷為登革熱

應配合的事項？

- 衛生局（所）將對您及您的鄰居實施訪視（疫情調查），確認是否有與您同樣症狀的人。如果您的親友出現類似症狀，應盡速通報並請他們前往醫療院所就醫。
- 若民眾住家或戶外有病媒蚊孳生源，經查核發現時，可依傳染病防治法第70條規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
- 病例發生之地區，住戶應配合接受訪視及配合衛生單位實施相關防疫工作（室內外噴藥、孳生源檢查等），以防止疫情擴散。
- 請清除居家內外之積水容器，使斑蚊無繁殖場所及機會，才能避免再被傳染。
- 請家戶及社區配合清除各種積水容器。必需使用之貯水容器，不用時倒置，使用時加蓋密封，至少每週換洗一次，並刷洗內壁以清除蟲卵。



高雄市區域級以上醫院

高雄市立小港醫院

（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）

高雄市小港區山明路482號 | (07)803-6783

高雄市立聯合醫院

高雄市鼓山區中華一路976號 | (07)555-2565

高雄市立大同醫院

高雄市前金區中華三路68號 | (07)291-1101

阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院

高雄市苓雅區成功一路162號 | (07)335-1121

國軍高雄總醫院

高雄市苓雅區中正一路2號 | (07)581-7121

高雄榮民總醫院

高雄市左營區大中一路386號 | (07)342-2121

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

高雄市三民區自由一路100號 | (07)312-1101

高雄長庚紀念醫院

高雄市鳥松區大埤路123號 | (07)731-8762

義大醫療財團法人義大醫院

高雄市燕巢區義大路1號 | (07)615-0011

國軍高雄總醫院左營分院

高雄市左營區軍校路553號 | (07)581-7121

登革熱特別門診 高雄市立民生醫院

高雄市苓雅區凱旋二路134號 | (07)751-1131



高雄市政府衛生局 關心您

疫情通報諮詢專線》(07) 723-0250

廣告

當被通報或確診為

登革熱 後

您該怎麼做？



後眼
窩痛

頭痛

紅疹

發燒
38°C
以上

骨
關
節
痛

頭
節
痛





登革熱是什麼？

登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由斑蚊叮咬而感染的急性傳染病，依抗原性可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型等四種型別。

一般症狀有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、噁心嘔吐、出疹等，典型登革熱死亡率低於1%，若是登革熱重症，死亡率可達20%。



登革熱重症警示徵象有哪些？

！出現警示徵象，應儘速至區域級以上醫院就醫！

持續嘔吐或無法飲食、嚴重腹痛、嗜睡、意識混亂、四肢冰冷、呼吸困難及出血症狀如流鼻血、牙齦出血、吐血、解黑便、經血量過多或異常陰道出血。




誰是登革熱重症高危險群？

年長者或有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病、癌症等慢性疾病以及免疫功能不全者，為登革熱重症的高危險群。



登革熱的傳染途徑？

登革熱病患於發病前一天至發病後第五天，血液中存在有登革病毒（此時期稱為病毒血症期），此時若被斑蚊叮咬，斑蚊因此感染病毒，而病毒在蚊蟲體內增殖8-12天後，病毒就會至病媒蚊的唾液腺，這隻斑蚊即具有傳染力，當它再叮咬其他健康人時，就將病毒傳出，這隻斑蚊終生均具有傳播病毒的能力。



民衆經醫師診斷為登革熱

應注意的事項？

- 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。
- 自您發病後五日內，應注意避免被蚊蟲叮咬，而將病毒藉由蚊蟲散播出去。
- 建議防蚊措施：
 - (1) 生病期間儘量在家休息、勿四處趴趴走。
 - (2) 穿著淺色長袖衣褲。
 - (3) 睡覺時掛蚊帳。
 - (4) 使用捕蚊燈或電蚊拍（蚊香僅具驅蚊效果）。
 - (5) 必要時塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
 - (6) 移除居家非必要的瓶瓶罐罐等積水容器。
 - (7) 詳加檢查可能的積水環境，如屋頂、陽台、庭院、騎樓、防火巷、屋後溝等住所可能積水的場所。
 - (8) 家中裝設紗窗紗門。



廢棄雜物勿堆積，
瓶瓶罐罐要丟棄。



盆栽花瓶勤換水，
每週刷洗最安心。



水桶陶器要倒放，
使用中的要加蓋。



遮蓋帆布要拉平，
窪地積水要填平。